

新型コロナウイルスワクチン提供依頼書

※配送希望日1日につき、1枚の提供依頼書をご提出ください。

必ず下段の留意事項をご確認いただき、ワクチンの配送希望日の前週火曜日までにご提出ください。
内容に変更が生じた際は、速やかに健康づくり担当までご連絡ください。

令和 年 月 日

下記のとおり、新型コロナウイルスワクチンの提供を依頼します。

依頼元医療機関				配送先（春日市内に限ります）	
医療機関名		<input type="checkbox"/> 貴院 <input type="checkbox"/> その他 施設名： 住所：			
担当者名					
電話番号					
配送希望日 (※原則、火曜日の午前中に配送します。)				月 日 (火)	
ワクチンの種類	【乳幼児】(XBB) オミクロン株 対応ファイザー	【小児】(XBB) オミクロン株 対応ファイザー	【成人】(XBB) オミクロン株 対応ファイザー	【成人】(XBB) オミクロン株 対応モデルナ	【成人】(XBB) オミクロン株 対応第一三共
対象年齢	6カ月～4歳	5～11歳	12歳以上	12歳以上	12歳以上
用途	初回接種及び追加接種に使用 (要希釈)	初回接種及び追加接種に使用 (要希釈)	初回接種及び追加接種に使用 (希釈不要)	初回接種及び追加接種に使用 (希釈不要)	追加接種(3回目以降)に使用 (希釈不要)
1バイアルあたりの接種回数	10回	10回	6回	5回	2回
数量	V	V	V	V	V
その他（バイアルホルダー、保冷バッグの貸出しを希望される場合は、こちらにご記入ください。）					

留意事項

- 概ね1カ月程度の接種者数を想定したワクチンの数量を依頼してください。
- ワクチン入荷量等によっては希望量をお届けできない可能性があります。
- ワクチンの希釈・充填は貴院で行ってください。希釈・充填に必要な針・シリンジ・生理食塩水はワクチンと一緒に配送します。
- 提供後は、医療機関の責任のもと適切にワクチンを保管してください。提供後のワクチンの交換・返却はできません。
- ワクチンの取り扱い方法等については各ウェブサイト等で必ずご確認ください。
- 火曜日が祝日の場合は翌営業日に配送します（年末年始を除く）。

【問い合わせ・提出先】

〒816-0851 春日市昇町1丁目120番地（いきいきプラザ2F） 春日市 健康課 健康づくり担当
Tel 092-501-1134 Fax 092-501-1135 E-mail kenkou@city.kasuga.fukuoka.jp

コミナティ 筋注 特例臨時接種における接種概要(各製剤の比較表)

「対象年齢」によって、複数の製剤が用意されています


製剤ごとに、バイアルキャップ・ラベルの色や対象者、保存・調製方法等が異なります。添付文書に記載の用法及び用量をご確認いただき、接種対象にお間違いないようご注意ください

保存方法に関わらず、いずれの場合も有効期間内にご使用ください

実際の接種では、「予防接種実施規則」及び「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領」に準拠して使用してください
添付文書は本製剤が承認された範囲で取り扱う場合の必要事項が記載されています

	6ヵ月～4歳用		5～11歳用			12歳以上用		
	コミナティ筋注 6ヵ月～4歳用 (1価:超源株) (紫)	コミナティ筋注 6ヵ月～4歳用 (1価:オミクロン株) XBB.1.5 (赤色)	コミナティ筋注 5～11歳用 (1価:超源株) (オレンジ)	コミナティ筋注 5～11歳用 (2価:超源株 オミクロン株BA.4・5) (オレンジ)	コミナティ筋注 5～11歳用 (1価:オミクロン株) XBB.1.5 (オレンジ)	コミナティ筋注 (1価:超源株) (紫)	コミナティ筋注 (2価:超源株 オミクロン株) (紫)	コミナティ筋注 (1価:オミクロン株) XBB.1.5 (灰色)
外観								
保存期間	超低温冷凍庫(-90～-60℃)	有効期間(24ヵ月)	有効期間(24ヵ月)		有効期間(18ヵ月)	有効期間(24ヵ月)	有効期間(24ヵ月)	有効期間(18ヵ月)
	冷凍庫(-25～-15℃)	保存不可	保存不可		保存不可	最長14日間*2	保存不可	保存不可
	冷蔵庫(2～8℃)	10週間	10週間		10週間	1ヵ月間(31日間)	10週間	10週間
	冷蔵庫(2～8℃)で解凍、希釈・穿刺前の状態で冷蔵保存	10週間	10週間		10週間	1ヵ月間(31日間)	10週間	10週間
解凍時間(目安)	冷蔵庫(2～8℃)	2時間	4時間		4時間	3時間	6時間	6時間
	室温(8～30℃)	30分	30分		30分	30分	30分	30分
希釈・充填	希釈時の生理食塩液の量	2.2mL	1.3mL		1.3mL	1.8mL	1.8mL	希釈しない
	1回あたりの接種量(有効成分の含量)	0.2mL(3μg)	0.2mL(10μg)		0.2mL(10μg)	0.3mL(30μg)	0.3mL(30μg)	0.3mL(30μg)
接種回数	1バイアルあたりの接種回数	10回	10回		10回	6回	6回	6回
	初回免疫*5	2023年9月20日以降は使用しません	1・2・3回目	2023年9月20日以降は使用しません	1・2回目	2023年9月20日以降は使用しません	1・2回目	1・2回目
	追加免疫	4回目以降	3回目以降	3回目以降	3回目以降	3回目以降	3回目以降	3回目以降

本剤の接種にあたっては、最新の「予防接種実施規則」、「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領」及び添付文書をご確認ください
出典：各製剤の添付文書、U.S. Food and Drug Administration「Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccines」
*1:「コミナティ筋注(2価:超源株/オミクロン株BA.4・5)」と「コミナティ筋注(2価:超源株/オミクロン株BA.4・5)」で同様の外観・保存期間・取り扱いとなります
*2:一度だけ超低温冷凍庫(-90～-60℃)に限り保存可能です
*3:一度室温(8～30℃)で解凍した場合は冷蔵庫(2～8℃)で保存可能ですが、24時間以内に使用していただき、再度再冷凍はしないでください
*4:希釈・穿刺後の接種液は冷蔵庫(2～8℃)または室温(8～30℃)で保存してください
*5:充填したバイアルの接種後の使用期限も同様です
*6:初回免疫の1回目にオミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン以外を接種し、2023年9月20日以降に2回目接種する場合は、前回の接種から27日以上の間隔をあけて、オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンを接種してください




コミナティ 筋注 特例臨時接種における接種概要(各製剤の比較表)

被接種者の年齢に応じて、適切なワクチンを選択してください

製剤ごとに接種回数や接種間隔に違いがあります。十分ご注意ください*1

2023年9月20日以降はオミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンを接種してください。初回免疫の1回目にオミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン以外を接種し、2023年9月20日以降に2回目を接種する場合は、交互接種*2となりますため、前回の接種から27日以上の間隔をあけて、オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンを接種してください*3



*1: 接種事業上の対象製剤に関しては最新の厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」:
<https://www.mhlw.go.jp/content/001148083.pdf>および2023年9月12日の自治体向け説明会資料:
<https://www.mhlw.go.jp/content/10806000/001145227.pdf>をご確認ください
*2: 交互接種とは、前回の接種と今回の接種で異なるワクチンを接種することであり、別企業のワクチンを使用する場合や同一企業のワクチンであっても対象年齢が異なるワクチンや対応する株・系統が異なるワクチンを使用する場合は交互接種に該当します
*3: 初回免疫の2回目以降の接種は、引き続き添付文書に記載の間隔をあけて接種してください
ファイザー新型コロナウイルスワクチン医療従事者専用サイト:<https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/>
厚生労働省「新型コロナウイルスワクチンについて」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html



新型コロナウイルスワクチン「コミナティ」は、ヒトエンテロウイルス219mRNA技術に基づき、ヒトエンテロウイルスファイバーにより共同開発された核酸スケルトンmRNAワクチンです。